

FLORES DE LIANAS BIGNONIACEAE DEL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ - 1

Ing. Ftal. Fabián Gatti / DRNEA - CIES, APN.



Adenocalymma marginatum
Nombre común: Cipó hú.
Distribución: NEA.
Ambiente: Selvas primarias.
Abundancia: Frecuente.



Adenocalymma paulistarum
Nombre común: Cipó hú.
Distribución: Misiones.
Ambiente: Selvas primarias.
Abundancia: Frecuente.



Dolichandra quadrivalvis
Nombre común: Uña de gato.
Distribución: Norte del país.
Ambiente: Selvas primarias.
Abundancia: Escasa.



Dolichandra uncata
Nombre común: Uña de gato.
Distribución: N- centro del país.
Ambiente: Selvas primarias.
Abundancia: Escasa.



Amphilophium carolinae
Nombre común: Peine de mono.
Distribución: NEA y NOA.
Ambiente: Selva de bajos.
Abundancia: Frecuente.



Pyrotegia venusta
Nombre común: Cipó San Juan.
Distribución: NOA y NEA.
Ambiente: Selvas primarias.
Abundancia: Frecuente.



Dolichandra unguis - cati
Nombre común: Uña de gato.
Distribución:-
Ambiente: Bordes de caminos.
Abundancia: Frecuente.



Dolichandra dentata
Nombre común: Uña de gato.
Distribución: Cuenca Paraná y Uruguay.
Ambiente: Selvas ribereñas.
Abundancia: Escasa.



Thynanthus micranthus
Nombre común: Cipó clavo.
Distribución: Misiones.
Ambiente: Palmital.
Abundancia: -



Fridericia florida
Nombre común:-
Distribución: Misiones.
Ambiente: Selvas ribereñas.
Abundancia:-

Bibliografía complementaria:

-Fabris, Humberto A. (1965). *Flora Argentina, Bignoniaceae*. Univ. Nacional de la Plata, Instituto del Museo de la Plata.

-Arbo, María Mercedes (1997). *El género Arrabidaea (Bignoniaceae) en Argentina: nuevos registros distribución y fenología*. Bonplandia 9 (3-4): 223-230.

Nomenclatura actualizada y sinonimias:

-Instituto de Botánica Darwinion (<http://www.darwin.edu.ar>). *Bignoniaceae, Géneros*. - Herbario del CIES, Familia Bignonaceae.